

Gwella adfer mangrof trwy ddefnyddio ‘Bwiau Bach’

Synwryddion hydroleg cost-isel, hunan-gydosod, a chod-agored

Cai Ladd^{1,2*}, **Sumana Banerjee**³, **Ly Bui**⁴, **Tuhin Ghosh**³, **Hue Le**⁴, **Tanh Nguyen**⁵,
Anh Quynh⁵, **Chau Tran**⁵, **Alejandra G Vovides**², **Marie-Christin Wimmeler**⁶, **Thorsten Balke**²


¹Prifysgol Abertawe, Cymru | ²Prifysgol Glasgow, Yr Alban | ³Prifysgol Jadavpur, India | ⁴Prifysgol Cenedlaethol Fietnam, Fietnam |
⁵Prifysgol An Giang, Fietnam | ⁶Prifysgol Technegol Dresden, Yr Almaen | *c.j.t.ladd@abertawe.ac.uk

Gwella adfer mangrof

Mae goroesiad hirdymor coedwigoedd mangrof wedi'u hadfer yn isel oherwydd bod y rhywogaethau anghywir yn aml yn cael eu plannu yn y lle anghywir¹. Mae angen ffordd syml o asesu addasrwydd yr amgylchfyd rhynglanwol i blannu coed, er mwyn gwella cyfraddau llwyddiant adfer mangrof yn fyd-eang.

Y Bwi Bach

Bwi Bach² yw fflotiau wedi'u hangori i'r rhynglanw sy'n cynnwys cofnodwyr cyflymiad wedi'u graddnodi i fesur gorlif, ceryntau, a thonnau. Mae'r Bwi Bach yn hawdd ei ddefnyddio a'i adeiladu trwy ddefnydd cydrannau rhad sydd ar gael yn fyd-eang. ▽




Mesur ceryntau a thonnau. Cromliniau graddnodi a cyfwng rhagfynegi 95% ar gyfer cyflymder cerrynt (mesuryddion cerrynt acwstig) a gogwydd (cyflymiad Bwi Bach) ar gyfer y dyluniadau **A** B4, **B** B4+, a **C** Pendant, a **Ch** cyflymder orbital tonnau (o Acoustic Doppler Velocimeter) a gwyrdd safonol mewn cyflymiad y dyluniad B4+.

Yr App

Rydym wedi adeiladu Ap R Shiny i ddadansoddi data a gasglwyd gan Fwiau Bach yn awtomatig. Mae'r Ap yn cymharu amodau hydrodynameg rhwng safle 'cyfeirnod' (e.e. mangrofau sefydledig) a safle 'targed' (e.e. ardal arfaethedig ar gyfer adfer) gyda destun cryno, tablau data, a ffigurau. Gall defnyddwyr lawrlwytho'r data i'w ddadansoddi ymhellach. ▽

Canlyniadau

Bydd Bwiau Bach yn galluogi monitro hir dymor ar raddfa fawr er mwyn deall yn well yr amodau bioffisegol sy'n angenrheidiol ar gyfer amddiffyn ac adfer coed mangrof.



Cymhwysiaid

Roedd hyd y llifogydd mewn safle adfer mangrof yng ngogledd Fietnam ar derfyn goddefiant ffisiolegol *Sonneratia*³ (stribed gwyrdd) – yn enwedig yn y rhanbarth llanw isel lle nad oedd y coed dwyflwydd oed yn goroesi (blychau coch). ▴



Ap y Bwiau Bach. Ar gyfer cymharu amodau hydrodynameg rhwng safleoedd 'cyfeirnod' (e.e. mangrofau sefydledig) a safleoedd 'targed' (e.e. ardal arfaethedig ar gyfer adfer) er mwyn pennu a fydd y safle targed yn debygol o lwyddo neu fethu.

Cyfeirnodau. ¹Lovelock et al. (2022) | ²Balke et al. (2021) | ³van Loon et al. (2007)